BASF
We create chemistry

バサグラン®・エアー1キロ粒剤

®=BASF社の登録商標

T.Maegaki
©2015-2024

防除可能な、処理時の最大雑草生育ステージ

ドローン散布に適した1キロ粒剤。
散布作業の省力化をサポートします。



■農林水産省登録：第24395号
■有効成分：ベンタゾンナトリウム塩（ベンタゾン）……33.0%
■人畜毒性：普通物※
※毒劇物に該当しないものを指していう通称

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稲	一年生雑草（イネ科を除く）、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ	移植後15日～収穫45日前まで	1kg/10a	1回	落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布	2回以内
					落水散布又はごく浅く湛水して散布	
直播水稲	一年生雑草（イネ科を除く）マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ	稲3葉期～収穫45日前まで			落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布	
					落水散布又はごく浅く湛水して散布	

2025年1月現在の登録内容

イヌホタルイ
草丈30cm程度
花茎4～5本まで

ヒレタゴボウ
草丈30cm程度にも優れた効果

水田内にイヌホタルイがあると、
アカスジカスミカメがイヌホタルイの小穂に産卵して
斑点米の発生リスクが高まります。

クログワイ※
草丈
15～20cm

ミズガヤツリ
5～7葉期
分株出始め
草丈20cm程度まで

オモダカ※
矢尻葉の
出てくる前まで

コナギ
舟形葉まで
（心形葉になると手強い）

舟形葉：付け根の細い舟の型をした葉

30cm
25cm
20cm
15cm
10cm
5cm
地際

※移植水稲のみ登録

BASF
We create chemistry

バサグラン剤を効かせるコツ！

水稲用中後期除草剤
バサグラン® 粒剤(ナトリウム塩) 液剤(ナトリウム塩) エアー1キロ粒剤

■水管理と処理タイミング

① **晴天**が続く時をねらって、
② **処理適期**に**落水**し、**水口**と**水尻**を**しっかり止める**。

③ **落水状態**、または**ごく浅水状態（足跡水程度）**で処理。

④ そのままの状態で**中3～4日間完全止水**。雨が降っても**水口水尻は閉じたままで落水しない**。



⑤ **処理後4～7日目**は、ひび割れし過ぎない程度に**さし水**し、

⑥ **7日経ったら通常水管理**に戻す。

※水源池・飲料用水等に本剤が飛散・流入しないように注意。

■バサグラン・エアー1キロ粒剤の推奨散布方法

○ドローンの推奨散布方法（バサグラン・エアー1キロ粒剤散布時の目安）

機体	散布装置	飛行速度（km/時）	インペラ回転数（rpm）	散布幅（m）	シャッター開度
T10/T30	GS110、GS110K GS220	15	600	5	9.7%
MG-1			1200	4	16.5%
YMR-08	GR1-10標準ローラー		固定	5	vol.64
	GR1-10ひし形ローラー				vol.15
AC101 connect	AC101 P13		中		11%
AC102	AC series P13				
飛助DX/mini	粒剤10kg/7kg、粒剤散布装置		1300	4	+2

※機材によって誤差が生じることがあるので、散布前に薬量の調節確認を実施してください。

○ドローン散布時の条件

ほ場周辺への飛散防止と薬剤を十分に拡散させるために、以下の条件を参考に散布してください。

飛行高度



風　速



畦畔からの距離



水　深

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空袋・空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

BASFジャパン株式会社
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階
0120-014-660 https://crop-protection.basf.co.jp/

詳細やSDSはWEBでご覧いただけます。 粒剤 液剤 エアー1キロ粒剤

問題雑草の対策に バサグラン

BASF-0850 1
202503